


# BOLETIM CLIMAPERD

ISSN 2675 - 9837

v. 05, n. 06 - Mai/2025

## PROGRAMA DE ESTUDOS DE LONGA DURAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE - MG (PELD/PERD)




Fulvio Cupolillo

Jean Monteiro Lima

MAI/2025



INSTITUTO FEDERAL  
Minas Gerais



**Presidente da República**

Luiz Inácio Lula da Silva

**Ministro de Estado da Educação**

Camilo Santana

**Reitor do Instituto Federal Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – IFMG**

Rafael Bastos Teixeira

**Pró-reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação, Desenvolvimento e Pesquisa - IFMG**

Gislayne Elisana Gonçalves

**Diretor Geral do IFMG - Campus Bambuí**

Humberto Garcia de Carvalho

**Coordenadora do Programa de Mestrado Profissional em Sustentabilidade e Tecnologias Ambientais – Campus Bambuí**

Ana Cardoso Clemente Filha Ferreira de Paula

**Diretor Geral do IFMG - Campus Governador Valadares**

Tonimar Domiciano Arrighi Senra

**Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMG - Campus Governador Valadares**

Bruno de Souza Toledo

**Editores**

Fulvio Cupolillo (IFMG – Campus Governador Valadares)

Jean Monteiro Lima (Doutorando – UFMG)

**Conselho Editorial**

Daniela Martins Cunha (IFMG – Campus Governador Valadares)

Evandro Klen Panquestor (IFMG – Campus Governador Valadares)

Jairo Rodrigues Silva (IFMG – Campus Ouro Preto)

Gustavo Augusto Lacorte (IFMG – Campus Bambuí)

Fernanda Morcatti Coura (IFMG – Campus Santa Luzia)

Hygor Aritides Victor Rossoni (UFV – Campus Florestal)

Carlos Fernando Lemos (UFV – Campus Florestal)

Ludmila Silva Brighenti (UEMG – Campus Divinópolis)

Wellington Lopes Assis (UFMG)

Diego Guimarães Florencio Pujoni (UFMG)

Lizandro Gemiacki (INMET - 5°DISME)

Copyright © 2020 – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG)

Qualquer parte desta publicação pode ser reproduzida, desde que citada a fonte.

Boletim CLIMAPERD / Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Edição Especial  
- v.05, n.06 – Mai/2025 – Governador Valadares: IFMG, 2025.

Disponível em:

<https://www.ifmg.edu.br/governadorvaladares/pesquisa/laboratorio-de-climatologia/boletim-climaperd>

ISSN 2675 - 9837 - Publicação Mensal

CLIMAPERD – v. 05, n. 06 – Mai/2025

## SUMÁRIO

<b>EDITORIAL</b>	<b>3</b>
<b>1 – INTRODUÇÃO</b>	<b>4</b>
<b>2 – OBJETIVO GERAL</b>	<b>5</b>
<b>3 – MATERIAIS E MÉTODOS</b>	<b>6</b>
<b>4 – RESULTADOS</b>	<b>8</b>
<b>5 – CONSIDERAÇÕES</b>	<b>16</b>
<b>6 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS</b>	<b>16</b>

## EDITORIAL

Desde 1999 o CNPq vem apoiando sítios de pesquisas ecológicas de longa duração no Brasil, denominados sítios PELD e que são áreas de referência para a Pesquisa Ecológica no Brasil. Localizam-se nos mais diversos ecossistemas e nos principais biomas brasileiros, incluindo áreas preservadas e não-preservadas, onde são desenvolvidos estudos abordando desde longas séries temporais de dados sobre os ecossistemas e suas biotas associadas, até pesquisas temáticas de menor duração.

O projeto PELD/UFMG, é coordenado pelo DSc. Prof. Francisco Barbosa, e somos responsáveis pelo sítio **MLRD**: Mata Atlântica e Sistema Lacustre do médio Rio Doce-MG, tendo como área “core” o Parque Estadual do Rio Doce-PERD e áreas do seu entorno. Participam do PELD sítio#4 MLRD as seguintes instituições de pesquisa, ensino e extensão: UFMG, UFSJ, UFOP, UEMG e IFMG. A equipe do IFMG é liderada pelo pesquisador DSc. Fulvio Cupolillo (IFMG – Campi Governador Valadares e Bambuí), responsável pelo Subprojeto 8 – Climatologia, no qual, o MSc. Jean Monteiro Lima (Doutorando pela UFMG) é um dos responsáveis pela elaboração desta série de boletins.

Neste número estamos lançando o Boletim Climatológico CLIMAPERD em sua 5<sup>a</sup> fase, 1 mês de análise de dados (maio/2025) de três estações meteorológicas localizadas no PERD e seu entorno (Caratinga e Timóteo).

Salienta-se que estas publicações, objetivam atender a demanda informativa dos pesquisadores e da sociedade em geral.

Os Autores

## 1 - INTRODUÇÃO

A Mata Atlântica é formada por um conjunto de ecossistemas florestais e ecossistemas associados. Trata-se de uma das florestas mais ricas em diversidade de paisagens, fauna, flora e culturas humanas. No entanto, apesar de sua magnitude, é um dos biomas mais fragmentados e destruídos do planeta (SOS MATA ATLÂNTICA, 2011).

Seguindo preceitos de conservação, o Parque Estadual do Rio Doce (PERD) se apresenta como uma pequena porção do bioma de Mata Atlântica existente no Brasil e no estado de Minas Gerais. É considerado o maior remanescente contínuo do bioma Mata Atlântica do Estado. Importante pela elevada biodiversidade e endemismos, como também abriga boa parte dos lagos que compõem o sistema lacustre do médio Rio Doce, terceiro maior do Brasil (IEF-MG, 2008).

A Unidade de Conservação (UC) do PERD está inserida na região do Vale do Aço (Figura 1), onde concentra grande atividade industrial voltada para a produção de aço, abrigando também, grandes monoculturas de eucalipto para abastecimento da siderurgia, indústria de celulose, madeireira e pequenas propriedades agrosilvopastoris. Esta UC sofre pressão direta no seu entorno, da expansão urbana da Região Metropolitana do Vale do Aço e indiretamente do leste margeado pelo município de Caratinga. Apresenta redução da zona de amortecimento com ocupações irregulares, desmatamentos ilegais e contaminação do ar e da água, além dos impactos causados pela atividade turística e desastres naturais.

Nimer (1979), aponta a região Sudeste como a que mais possui um clima de transição, onde as turbulências e instabilidades atmosféricas dificultam as previsões de tempo, como reforçado por Cupolillo (2015), salientando que a atuação de vários sistemas atmosféricos acarreta dificuldades em identificar qual sistema atmosférico está atuando com maior ou menor intensidade na formação do tempo ou clima.

Da diversidade de sistemas atmosféricos atuantes na Região Sudeste do Brasil, alguns interferem no PERD, como: o Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul - ASAS; Zona de Convergência da América do Sul - ZCAS<sup>1</sup>; os Sistemas Frontais - SF; o Anticiclone Alta da Bolívia - AB; Vórtice Ciclônico de Altos Níveis - VCAN e o Cavado do Nordeste - CN.

---

<sup>1</sup> Define-se como mais apropriado para a Zona de Convergência o uso da nomenclatura “Zona de Convergência da América do Sul” em vez de “Zona de Convergência do Atlântico Sul”, devido este mecanismo atmosférico ocorrer predominantemente sobre o continente, o qual é fator determinante para sua formação conforme Amaro, Lacerda e Molion (2008).




Figura 1 – Localização do Parque Estadual do Rio Doce – PERD.

Fonte: Elaborado pelos autores

Este boletim apresenta uma interpretação do comportamento dos dados meteorológicos de precipitação e temperatura no mês de maio de 2025, bem como uma análise das chuvas e temperaturas no início da estação chuvosa do ano hidrológico 2024/2025.

## 2 - OBJETIVO GERAL

- Analisar o comportamento climático no PERD no mês de maio de 2025.

### 2.1- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Compreender melhor as interações dos aspectos climatológicos com o bioma vigente no PERD;
- Demonstrar o comportamento das chuvas e temperatura média na região do PERD e seu entorno;
- Identificar os mecanismos atmosféricos que influenciam das chuvas e temperatura.

### 3 - MATERIAIS E MÉTODOS

Os métodos aplicados para a realização deste estudo utilizaram uma série de dados climatológicos de outubro de 2024 a maio de 2025, coletados nas estações meteorológicas automáticas dos municípios de Caratinga, Timóteo e no PERD (Tabela 1), disponibilizados pelo INPE e INMET, de modo a investigar a distribuição das chuvas e comportamento das temperaturas médias, bem como sua influência no sistema lacustre, quanto para o bioma do PERD.

**TABELA 1 - LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS**

LOCALIDADE	LATITUDE	LONGITUDE	ALTITUDE(m)	CODIGO-INSTITUIÇÃO
PERD/ Marliéria/MG	-19.803	-42.638	297	PCD 30800 – INPE
TIMÓTEO	-19.5736	-42,6222	333	A511 - INMET
CARATINGA	-19.7358	-42,1536	615	A554 – INMET

Fonte: INPE e INMET, 2022.

Os dados das estações meteorológicas foram agrupados de outubro de 2024 a maio de 2025 em períodos decendiais (10 dias), sendo que cada mês possui 3 decêndios conforme Cupolillo (2015).

Calculou-se a temperatura do ar através do somatório da frequência média de ocorrência da variável para cada decêndio dos meses (outubro de 2024 a maio de 2025), onde se obteve a temperatura média para cada decêndio correspondentes a cada uma das três estações meteorológicas.

A precipitação da chuva foi calculada através do somatório da frequência de ocorrência da variável pluviosidade a cada decêndio dos meses (outubro de 2024 a maio de 2025), correspondentes a cada uma das três estações meteorológicas.

De posse dos dados decendiais de chuva acumulada e temperatura média construiu-se histogramas para cada uma das estações meteorológicas em estudo.

Foram também elaborados mapas mensais do mês de maio de 2025, espacializando os elementos climáticos de temperatura e precipitação a partir da ferramenta geoestatística do software ArcGIS 10.5.

Conforme Cupolillo (2015), foram geradas isolinhas através do modelo matemático de interpolação determinístico *Inverse Distance Weighting (IDW)*. As superfícies estatísticas geradas apresentaram melhor a realidade geográfica da bacia do Rio Doce. Este mesmo

interpolador foi utilizado por Antunes (2018) em função do número reduzido de estações meteorológicas instaladas no PERD e proximidades (Vieira, 2020).

Para verificar os processos dinâmicos que atuam sobre a América do Sul e oceanos adjacentes, foram gerados mapas climatológicos de linha de corrente decendiais do mês de maio de 2025, utilizando dados de reanálise<sup>2</sup> do NCEP (*National Center for Environment Prediction*), obtidos via portal do CDC/NOAA (*Climate Diagnostic Center/National Oceanic and Atmospheric Administration*). Foram considerados dados diários de vento, com resolução horizontal de 2,5° x 2,5° e trabalhados no visualizador gráfico GrADS (*Grid Analysis and Display System*).

De acordo com a Figura 2, o domínio espacial para América do Sul, Oceanos Pacífico e Atlântico, será definido entre as coordenadas geográficas entre 15° de latitude norte, 60° de latitude sul, 90° de longitude oeste e 20° de longitude leste, englobando as variáveis: componentes meridional e zonal do vento; convergência e divergência; e linhas de corrente para os níveis de 200 hPa, 500hPa e 850 hPa. (CUPOLILLO, 2015).




Figura 2 – Localização do Domínio Espacial para plotar Linhas de Corrente.  
Fonte: Elaborado pelos autores

<sup>2</sup> Dados de Reanálise é um conjunto de dados obtidos a partir de modelos de circulação global com dados obtidos através da assimilação e sintetização de dados observados em todo o planeta.

## 4 - RESULTADOS

Os resultados obtidos nas análises dos dados das estações meteorológicas estão dispostos em forma de histogramas nas Figuras 3a, 3b e 3c, representando o acumulado de chuvas e comportamento da temperatura média, para cada estação meteorológica da região do PERD e seu entorno.




Figura 3: Histograma de Chuva e Temperatura: Caratinga (a); Timóteo (b) e PERD (c) – (outubro de 2024 a maio de 2025).

FONTE dos Dados: INMET e INPE

Nota-se (Figuras 3a, 3b e 3c), que os decêndios são distribuídos de outubro de 2024 a maio de 2025, e relacionam-se ao ano hidrológico com a estação chuvosa (2024-2025). Salienta-se que na climatologia do PERD a estação chuvosa estende-se de outubro 2024 a março de 2025, enquanto a estação seca de abril a setembro de 2025. Após um período de estação chuvosa finalizado em março de 2025, segue o 2º mês da estação seca, maio de 2025, com cotas pluviométricas variando entre 0,4 mm e 15,6 mm ambos no 3º decêndio, nas estações, respectivamente, do PERD e de Timóteo.

O somatório dos três decêndios de maio, comparado ao mês anterior, demonstraram valores bastante inferiores. Desta maneira, o total de chuvas nas três estações Caratinga, Timóteo e PERD, foram cotados respectivamente, como: 4,4 mm, 21,6 mm e 2,6 mm (Figuras 3a, 3b e 3c).

Quanto a temperatura média do mês de maio, os valores mais elevados ocorreram no 1º decêndio em todas as estações, com: 22,43°C em Caratinga, 20,98°C em Timóteo e no PERD 21,7°C. Enquanto os valores inferiores foram encontrados, no 2º decêndio em todas as estações, com: 21,56°C em Caratinga, 20,13°C no PERD e 20,84°C (Figuras 3a, 3b e 3c).




Figura 4 - Espacialização da Temperatura Média em maio de 2025.  
FONTE dos Dados: INMET e INPE

Ao analisar as temperaturas médias mensais, distribuídas espacialmente, no mês de maio (Figura 4), verifica-se que no PERD apresenta-se com dois territórios térmicos nos seguintes intervalos de classes: centro-sul entre 21,1°C à 22,0°C e o centro-norte entre 20,1°C à 21,0°C.

Quanto à precipitação acumulada (Figura 5), o padrão de chuvas é distribuído, em dois territórios pluviométricos, distribuídos no sentido norte-sul, com os intervalos de classes: no centro-sul entre 0,1 mm à 10,0 mm e no centro-norte entre 10,1 mm à 20,0 mm.




Figura 5 - Espacialização da Chuva da Acumulada em maio de 2025.  
FONTE dos Dados: INMET e INPE

As figuras 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b e 8c, referem-se aos mapas de linhas de corrente. Nota-se no 1ºdecêndio de maio, no nível de 200 hPa (Figura 6a), a predominância do Cavado do Nordeste (CN). A Alta da Bolívia (AB) mantém-se em sua posição Climatológica, escoando pouca umidade para o sudeste do Brasil e, por conseguinte para o PERD. Quanto ao Jato Subtropical (JS), encontra-se em sua posição zonal, em Minas Gerais estendendo-se até a porção meridional do continente.

No nível de 500 hPa (Figura 6b), observou-se o Anticiclone Subtropical do Pacífico Sul (ASPS) em sua posição climatológica, sobre o oceano Pacífico, enquanto a borda do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), como também a formação de um Bloqueio

Atmosférico (BA), sobre o Brasil Central entendendo-se para Minas Gerais, direcionando subsidência de ar seco sobre a região do PERD, contribuindo também para a redução das chuvas. Quanto ao jato subtropical (JS), manteve-se em sua posição zonal, do Estado de Minas Gerais até o sul do continente.

No nível de 850 hPa (Figura 6c), manteve-se a oeste da América do Sul, sobre o Oceano Pacífico o Anticiclone Subtropical do Pacífico Sul (ASPS) e no sentido leste-oeste o Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), com o seu centro sobre o Oceano Atlântico e sua borda ocidental, sobre Minas Gerais, provocando subsidência (descida) do ar, reduzindo as chuvas no PERD. Se comparado com o 3ºdecêndio do mês anterior na região do PERD, as cotas pluviométricas reduziram bruscamente neste 1º decêndio. Quanto ao JS, encontra-se deslocado do sul de minas até a porção meridional da América do Sul.

Desta maneira, o total de chuvas nas três estações: Caratinga, Timóteo e PERD, foram cotadas respectivamente, como: 1,6 mm, 1,8 mm e 1,2 mm (Figuras 3a, 3b e 3c).

No 2ºdecêndio de maio, ao nível de 200 hPa (Figura 7a), persiste a predominância do jato Subtropical (JS), mantendo-se em sua posição zonal, estendendo-se desde a Bahia até a porção meridional da América do Sul.

No nível de 500 hPa, (Figura 7b) observou-se o ASPS em sua posição climatológica, sobre o oceano Pacífico, enquanto a borda ocidental e o núcleo do ASAS, encontra-se sobre leste Minas, conduzindo o ar subsidente, para a região do PERD, reduzindo intensamente as chuvas. Concomitantemente, a este fato, encontra-se a Alta da Bolívia (AB), ao sul de sua posição climatológica, o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) sobre o Oceano Atlântico e o Jato Subtropical (JS), que se manteve em sua posição zonal, estendendo do sul de Minas Gerais até a porção meridional do sul do continente.

Em 850 hPa (Figura 7c), encontra-se a oeste da América do Sul, sobre o Oceano Pacífico o ASPS. No sentido leste-oeste, verifica-se a presença do ASAS sobre o oceano Atlântico, persistindo, desde o 1ºdecêndio a sua atuação e intensificando sua borda ocidental sobre o sudeste brasileiro, com seu giro anti-horário, induzindo subsidência (descida), do ar sobre a superfície, reduzindo ainda mais as chuvas na região do PERD. Quanto ao JS, encontra-se deslocado para a extrema porção meridional da América do Sul.

Desta maneira, este decêndio, registrou as cotas pluviométricas mais baixas, na região do PERD, no mês de maio, cujas estações de Caratinga, Timóteo e PERD, foram cotadas respectivamente, com: 1,4 mm, 15,6 mm e 0,4 mm (Figuras 3a, 3b e 3c).

No 2ºdecêndio de maio, ao nível de 200 hPa (Figura 7a), persiste a predominância do jato Subtropical (JS), mantendo-se em sua posição zonal, estendendo-se desde a Bahia até a porção meridional da América do Sul.

No nível de 500 hPa, (Figura 8b), observou-se o ASPS em sua posição climatológica, sobre o oceano Pacífico, enquanto a borda ocidental e o núcleo do ASAS, encontra-se sobre norte e nordeste de Minas, conduzindo o ar subsidente, para a região do PERD, reduzindo intensamente as chuvas. Concomitantemente, a este fato, encontra-se a Alta da Bolívia (AB), ao sul de sua posição climatológica, o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) sobre o Oceano Atlântico e o Jato Subtropical (JS), que se manteve em sua posição zonal, estendendo do sul de Minas Gerais até a porção meridional do sul do continente.

Em 850 hPa (Figura 8c), encontra-se a oeste da América do Sul, sobre o Oceano Pacífico o ASPS. No sentido leste-oeste, verifica-se a presença do ASAS sobre o oceano Atlântico, persistindo, desde o 1ºdecêndio a sua atuação e intensificando sua borda ocidental sobre o sudeste brasileiro, com seu giro anti-horário, induzindo subsidência (descida), do ar sobre a superfície, reduzindo ainda mais as chuvas na região do PERD. Quanto ao JS, encontra-se deslocado para a extrema porção meridional da América do Sul.

Tal fato foi determinante para reduzir as cotas pluviométricas, do mês de maio, neste 3º decêndio de abril, na região do PERD, destacando-se: 1,4 mm em Caratinga, 4,2 mm em Timóteo e 1,0 mm no PERD (Figuras 3c).

As normais climatológicas do INMET (1991-2020), na região em torno do PERD, no mês de maio, apresentam uma variabilidade entre 33,4 mm em Caratinga e 37,3 mm em Timóteo. Desta maneira, pode-se afirmar que, em maio de 2025, as chuvas nas estações de Caratinga e Timóteo estiveram abaixo da média. Tal fato, pode ser explicado pela influência dos mecanismos atmosféricos: VCAN, CN, BA e ASAS responsáveis pela diminuição neste mês de maio de 2025 e pelo fator orografia (topografia), interferindo na distribuição regional das chuvas.

As condições dinâmicas no mês de maio de 2025, estudadas a partir dos campos de linha de corrente, identificam que os mecanismos de escala sinóticas atuantes no continente e que influenciam na climatologia do PERD são: Anticiclone do Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), Jato Subtropical (JS), Vórtice ciclônico de Altos Níveis (VCAN), Cavado do Nordeste (CN) e Bloqueio Atmosférico (BA). Tais condições dinâmicas foram pesquisadas por Cupolillo (2015) para toda a bacia do rio Doce e Antunes (2018), Lima (2019), Cunha (2019), Vieira (2020) para o PERD e Andrade (2024).




Figura 6 - Campos de Linha de Corrente 200 hPa. - (a), 500 hPa. - (b) e 850 hPa – (c), do 1º Decêndio de maio de 2025; demonstrando interação entre os sistemas atmosféricos: Jato Subtropical (JS), Alta da Bolívia (AB), Cavado (CV), Bloqueio Atmosférico (BA), Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) e o Anticiclone Subtropical do Pacífico Sul (ASPS).

FONTE - Dados: NOAA 2025.




Figura 7 - Campos de Linha de Corrente 200 hPa. - (a), 500 hPa. - (b) e 850 hPa – (c), do 2º Decêndio de maio de 2025; demonstrando interação entre os sistemas atmosféricos: Jato Subtropical (JS), Alta da Bolívia (AB), Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) e o Anticiclone Subtropical do Pacífico Sul (ASPS).

FONTE - Dados: NOAA 2025.




Figura 8 - Campos de Linha de Corrente 200 hPa - (a), 500 hPa. - (b) e 850 hPa – (c), do 3º Decêndio de maio de 2025; demonstrando interação entre os sistemas atmosféricos: Jato Subtropical (JS), Bloqueio Atmosférico (BA) Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) e Anticiclone Subtropical do Pacífico Sul (ASPS).  
FONTE - Dados: NOAA 2025.

## 5 - CONSIDERAÇÕES

Este Boletim foi dividido em três partes: a) Histograma decendial de temperatura e chuva; b) Espacialização do mês de maio – temperatura e chuva; c) Aspectos dinâmicos.

### a) Com relação ao histograma: temperatura e chuva PERD.

Observou-se que neste mês de maio houve uma brusca diminuição das cotas pluviométricas se comparadas ao mês anterior em função da presença e comportamento, principalmente, dos mecanismos atmosféricos: JS, ASAS, VCAN, CN e BA. Quanto às temperaturas médias, tiveram uma ligeira diminuição. Tal fato deve-se à posição sazonal do sol em relação a posição latitudinal.

### b) Espacialização da temperatura e chuva no PERD.

Durante o mês de maio, no PERD, à espacialização da temperatura média encontra-se dividida dois territórios térmicos nos seguintes intervalos de classes: centro-sul entre 21,1°C à 22,0°C e o centro-norte entre 20,1 °C à 21,0°C.

Quanto à espacialização das chuvas distribuem-se, em dois territórios pluviométricos, distribuídos no sentido norte-sul, com os intervalos de classes: no centro-sul entre 0,1 mm à 10,0 mm e no centro-norte entre 10,1 mm à 20,0 mm.

### Aspectos dinâmicos

O escoamento do ar atmosférico, em 200 hPa, 500hPa e 850 hPa, foi marcante nos decêndios de maio, com a formação, dos mecanismos atmosféricos, com posições climatológicas da JS, ASAS, VCAN, CN e a BA, que contribuíram para uma intensa diminuição da umidade relativa do ar, e consequentemente das chuvas na região do PERD.

## 6 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMARO, H. A.; LACERDA, E. G.; MOLION, L. C. B. **Um episódio da Zona de Convergência na América do Sul.** Rev. Bras. Geof. vol.17 n.2 -3, 2008.

ANDRADE, R.N de. **Diagnóstico Climatológico do Monumento Natural Estadual Pico da Ibituruna.** Dissertação (Mestrado Profissional em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - IFMG, Bambuí - MG, 2024.

ANTUNES, D. A. **Diagnóstico Climatológico do Parque Estadual do Rio Doce – PERD.** Dissertação (Mestrado Profissional em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - IFMG, Bambuí - MG, 2018.

CUPOLILLO, F. **Diagnóstico Hidroclimatológico da Bacia do Rio Doce.** 1<sup>a</sup> Ed. Saarbucken – Alemanha: Novas Edições Acadêmicas, 2015.

CUNHA, D. M. **Variabilidade das chuvas na Bacia Hidrográfica do Rio Doce –MG/ES no período de 1991 a 2017.** Tese (Doutorado) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Programa de Pós-Graduação em Geografia - Tratamento da Informação Espacial. Belo Horizonte, 2019. 281f.

ENVIRONMENTAL SYSTEMS RESEARCH INSTITUTE (ESRI). **ArcGIS Professional.** GIS for the desktop, versão 10.5, 2015. Disponível em: <http://www.esri.com/software/arcgis/index.html> . Acesso em 02 de junho de 2025.

GEORGE MASON UNIVERSATY **GrADS versão 2.0.2,** 2016. Disponível em: <http://cola.gmu.edu/grads/>. Acesso em 02 de junho de 2025.

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS-IEF. **PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE.** 2008. Disponível em: <http://www.ief.gov.br/component/content/360?task=view>. Acesso em 02 de junho de 2025.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA DO BRASIL – INMET. **Dados Meteorológicos Estações Automáticas.** Disponível em: <https://tempo.inmet.gov.br/TabelaEstacoes/A001> : Acesso em junho de 2025.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). **Plano de Dados Abertos (PDA) – Sistema Integrado de Dados Ambientais (SINDA).** Disponível em: <http://sinda.crn.inpe.br/PCD/SITE/novo/site/index.php> : Acesso em 02 de junho de 2025.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA DO BRASIL/5<sup>º</sup>Distrito de METEOROLOGIA – INMET/5<sup>º</sup>DISME. **Boletim Mensal para Minas Gerais.** junho de 2025.

Kalnay et al., The NCEP/NCAR 40-year **reanalysis project**, Bull. Amer. Meteor. Soc., 77, 437-470, 1996. Disponivel em: <https://psl.noaa.gov/> Acesso em 02 de junho de 2025.

LIMA, J. M. **Análise espaço-temporal das chuvas persistentes na região do Parque Estadual do Rio Doce – PERD (2005 A 2015).** Dissertação (Mestrado) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. Bambuí, 2019. 346 p.

NIMER, E.; 1979: **Climatologia do Brasil.** Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Rio de Janeiro, RJ; 421 p.

SOS MATA ATLÂNTICA. 2011 – **Documento disponível [online] na Internet.** Disponível em: [http://www.sosmatatlantica.org.br/index.php?section=info&action =mata](http://www.sosmatatlantica.org.br/index.php?section=info&action=mata). Consulta em 20 outubro 2023.

TUBELIS, A. NASCIMENTO, F. J.L. **Meteorologia Descritiva: Fundamentos e Aplicações Brasileiras.** São Paulo: Edt. Nobel, 1992, 1<sup>a</sup>.edição.

VIEIRA,C. A; **Estudo da atuação do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) sobre a Região do Parque Estadual do Rio Doce e seu entorno.** Dissertação (Mestrado) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. Bambuí, 2020. 176 p.

VIEIRA, C. A. ; CUPOLILLO, F. ; LIMA, J. M. ; NUNES, J. B. C. . **Orientação para Interpoladores de Parâmetros Climáticos.** 2020. Cartilha Técnica - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. Bambuí, 2020.